

IMPFKALENDER

Stand: 2018
Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Empfohlenes Impfalter	Alter in Monaten					Alter in Jahren					
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-17	ab 18	ab 60
Impfung gegen											
Rotaviren ^{a)}	G ₁ ab 6 Wochen	G ₂	(G ₃)								
Wundstarrkrampf (Tetanus)	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄	N		A ₁	N	A ₂	A ^{d)}	
Diphtherie	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄	N		A ₁	N	A ₂	A ^{c)}	
Keuchhusten (Pertussis)	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄	N		A ₁	N	A ₂	A ^{d)}	
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	G ₁	G ₂ ^{b)}	G ₃	G ₄	N				A ₁	ggf. N	
Hepatitis B	G ₁	G ₂ ^{b)}	G ₃	G ₄	N						
Haemophilus Influenzae Typ b (Hib)	G ₁	G ₂ ^{b)}	G ₃	G ₄	N						
Pneumokokken ^{e)}	G ₁		G ₃	G ₄	N						S ^{f)}
Meningokokken				G ₁ ^{g)}			N				
Masern, Mumps, Röteln (MMR)				G ₁	G ₂		N			S ^{h)}	
Windpocken (Varizellen)				G ₁	G ₂		N				
Humane Papillomviren (HPV)									S ⁱ⁾		
Influenza											S

G Grundimmunisierung **S** Standardimpfung **A** Auffrischimpfung **N** Nachholimpfung

- a)** Je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen im Mindestabstand von je 4 Wochen, Impfungen bevorzugt bis zur 16. bzw. 22. Lebenswoche, spätestens bis zur 24. bzw. 32. Woche abschließen.
- b)** Bei Einzelimpfstoffen kann diese Dosis entfallen.
- c)** Auffrischimpfung alle 10 Jahre.
- d)** Die nächste fällige Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfung soll einmalig mit einem Td-Pertussie bzw. Td-Pertussie-Poliomyelitis-Impfstoff erfolgen.
- e)** Frühgeborene erhalten 1 zusätzliche Dosis mit 3 Mon. (Insg. 4 Impf.)
- f)** Einmalige Impfung ggf. Auffrischimpfung.
- g)** Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat
- h)** Einmalige Massern-Impfung (MMR) für alle nach 1970 Geborenen ohne ausreichenden Impfschutz.
- i)** Für Mädchen und Jungen von 9-14 Jahre: 2 Impfungen im Mindestabstand von 5 Monaten.
Ab 15 Jahre: 3 Impfungen im Schema 0-1 (2) - 6 Monate.
Nachholimpfungen bis 17 Jahre empfohlen.

Ziel muss es sein, möglichst frühzeitig einen vollständigen Impfschutz zu erreichen. Abweichungen sind möglich und ggf. notwendig.